

Spasmoglucinol

Spasmoglucinol tabletten (hond en kat)
Uro-genitaal spasmolyticum

Samenstelling

Floroglucinol anhydraat 31 mg
Trimethyl floroglucinol 40 mg
Excipients QSP 1 tablet

Farmaceutische vorm

Tabletten.

Eigenschappen

Spasmoglucinol is een spasmolyticum met een uitgesproken werking op de urine wegen en op het geslachtsapparaat.

Het werkt op de gladde spiervezels. Het werkt ontspannend op spastische sterk samengetrokken vezels, terwijl de normale spiertonus en contracties van de niet spastische vezels gehandhaafd blijven. Spasmoglucinol heeft een uitgesproken specifieke pijnstillende werking op de urinewegen. Daarbuiten is er geen pijnstillende werking. Hierdoor kan het bij gebruik een waardevol hulpmiddel zijn bij het vaststellen van de oorzaak van de pijn. Spasmoglucinol werkt spasmen tegen met een specifieke werking op de urinewegen en het geslachtsapparaat. Het wordt gebruikt om de hulp bij geboorten te vereenvoudigen, zoals bij spasmen en oedeem van de baarmoederhals en bij keizersnede. Bij de behandeling van urinewegklachten als gevolg van stenen wordt het uitplassen van stenen door dit middel vergemakkelijkt. Ook kan het gebruikt worden bij aanbrengen van urineweg katheters. Tevens kan het gebruikt worden als aanvullende behandeling van blaasontsteking. De toxiciteit van het product is te verwaarlozen, zowel op korte als op lange termijn. Het veroorzaakt geen organische letsels, noch hemotoxiciteit of storende bijwerkingen. Er zijn geen contra-indicaties, ook niet bij langdurig gebruik.

Diersoorten waarvoor het middel bestemd is

Hond en kat.

Toepassing

- Het product is een anti-spasmodicum
- Migratie van urinaire stenen
- Behandeling van lithiasis
- Post-chirurgische urethrale sondering

Contra-indicaties

Geen.

Bijwerkingen

Sloom.

Bijzondere voorzorgen bij gebruik

Wanneer blijkt dat verlenging van de behandeling noodzakelijk is, mogen de injecties herhaald worden in dezelfde doseringen om de 8 à 12 uren gedurende meerdere dagen. In geval van de partus, mag de voorgeschreven dosis herhaald worden na een half uur, indien nodig. In geval van baarmoederatonie, mogen ocytocines gecombineerd worden met Spasmoglucinol. Om het effect van zulke producten te optimaliseren, wordt aangeraden deze pas na 10 minuten na de injectie van Spasmoglucinol toe te dienen.

Dosering en wijze van toediening

Oraal

Hond: 1 tablet/10 kg 2x daags

Kat: 1 tablet 2x daags

Het tablet kan rechtstreeks in de mond van het dier gegeven worden of gemengd worden in een stukje vlees.

De tabletten mogen verbrijzeld worden en vermengd in de voeding.

Steeds vers drinkwater ter beschikking stellen.

Farmaceutische gegevens

Onverenigbaarheden: Geen bekend

Verpakkingen

Doosje met 20 tabletten.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Voor het verwijderen van niet-gebruikte producten.

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou terechtkomen.